

## Vogelschlagrisiko-Vorhersage für Anfang bis Mitte August 2021

Die Brutzeit ist nun größtenteils abgeschlossen, aber die Vogelschlaggefahr bleibt an deutschen Flughäfen im hohen Bereich. Das Risiko geht zum einen weiterhin von jungen, unerfahrenen Greifen wie Bussarden und Turmfalken aus, die oftmals direkt an oder auf der Piste bzw. über den Grünflächen jagen. Jungvögel schließen sich jetzt oftmals zu Trupps zusammen und auch Altvögel sind nach der Brutzeit geselliger bei der Nahrungssuche, sodass sie gehäuft an Flughäfen auftreten können. Zudem sammeln sich Kiebitze und Stare jetzt in größeren Trupps und führen Zwischenzüge zu neuen Nahrungsquellen wie Obstplantagen, Weinbergen und Feuchtgebieten durch, wobei im Normalfall aber maximal Höhen von 2.000 ft erreicht werden. Mahd und Ernte am Flughafen und im Umfeld locken weiterhin viele Vögel an und während bzw. kurz nach der Mahd muss am Flughafen mit größeren Ansammlungen von Krähen, Möwen, Greifen sowie Reiher und Störchen gerechnet werden.

Zum anderen setzt jetzt im August der Vogelzug einiger Arten ein. Dabei handelt es sich vorwiegend um früh ziehende Mauersegler und Watvögel, teilweise auch kleine Singvögel. Schwalben (siehe unten) werden dagegen noch in stabil hohen Beständen gemeldet, aber die Schwarmgrößen steigen deutlich an. Die Bestände bei Feldlerche und Grauammer haben dagegen schon deutlich abgenommen, während sich Limikolen derzeit an den Küsten in größeren Trupps sammeln. Das betrifft derzeit vor allem Alpen- und Sichelstrandläufer (siehe unten). Auch in der Region des Bodensees oder großer Flussniederungen befinden sich Sammelpplätze und es kann lokal zu Wasservogelmassierungen kommen. Auch bei Weißstorch und Kranich werden zunehmend größere Trupps beobachtet. Wat- und Singvögel ziehen oftmals nachts und in Höhen bis zu 6.000 ft. Winde aus nordöstlichen Richtungen begünstigen den Start des Vogelzuges ins Winterquartier, während Gewitter, Niederschlag und Sturm diesen lokal verzögern können.

Die aktuelle Birdtam-Situation sollte bei der Flugvorbereitung unter <https://www.notams.faa.gov/common/birdtam.html> besondere Beachtung finden.



Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*), oben links;  
Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*), oben rechts;  
Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*), unten links;  
Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*), unten rechts.

